

【食道がん】

(2023年2月更新)

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
FP療法	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	2時間	d1	28日
	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	24時間	d1～5	
FP療法+RT	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	2時間	d1	56日
	フルオロウラシル	700mg/m ²	点滴	24時間	d1～4、d29～32	
DTX療法	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴	1時間	d1	21日
weeklyPTX療法	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	1時間	d1、8、15	28日
DCF療法	ドセタキセル	30～40mg/m ²	点滴	1時間	d1、15	28日
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	24時間	d1～5	
Nivo療法	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	d1	14日
Nivo(2週毎)+Ipi療法	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	d1、d15、d29	42日
	イピリムマブ	1mg /kg	点滴	30分	d1	
Nivo(3週毎)+Ipi療法	ニボルマブ	360mg/body	点滴	30分	d1、d22	42日
	イピリムマブ	1mg /kg	点滴	30分	d1	