

【大腸がん】

(2023年2月更新)

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
FOLFIRI療法	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
mFOLFOX6療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Bev+FOLFIRI療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→30分	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Bev+mFOLFOX6療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→30分	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Cmab+FOLFIRI療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	2時間→1時間	d1、8	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Cmab+mFOLFOX6療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	2時間→1時間	d1、8	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Cmab+CPT-11療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	2時間→1時間	d1、8、15、22、29、36、43	49日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	d1、15、29	
Cmab療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	2時間→1時間	d1	7日
XELOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間	d1	21日
	カペシタビン	2000mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
Bev+XELOX療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90分→30分	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	カペシタビン	2000mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
IRIS療法	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	21日
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
Pmab+FOLFIRI療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	

【大腸がん】

(2023年2月更新)

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
Pmab+mFOLFOX6療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Pmab療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
Bev+IRIS療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90分→30分	d1	21日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	d1	
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
SOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間	d1	21日
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
Bev+SOX療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90分→30分	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
Pmab+CPT-11療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	
Ram+FOLFIRI療法	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Bev+カペシタビン療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90分→30分	d1	21日
	カペシタビン	2000mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
Aflibercept+FOLFIRI療法	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
Bev+TAS-102療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→30分	d1、15	28日
	トリフルリジンチピラシル	70mg/m ²	経口	—	d1夕～6朝、d8夕～13朝	